



Vaccinet ges två gånger med 6 månaders mellanrum. Efter 14 års ålder behövs tre doser. Medgivandet gäller alla doserna. Meddela om förutsättningarna ändras mellan sprutorna.

Mer information om HPV-vaccination hittar du på www.folkhalsomyndigheten.se

Du kan också vända dig till skolsköterskan för att få mer information.

Personuppgifter

Elevens namn	Personnummer
Skola	Årskurs och klass

Jag ger mitt/vårt tillstånd till att mitt barn vaccineras HPV, humant papillomvirus

<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
--

Hälsofrågor

Har eleven allvarlig allergi eller fått allvarlig allergisk reaktion? Om ja, ange vad/hur.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Har eleven någon allvarlig kronisk sjukdom? Om ja, ange vad.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Har eleven reagerat kraftigt på tidigare vaccinationer? ? Om ja, ange vad/hur.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

Underskrift vårdnadshavare (*I de fall det finns två vårdnadshavare ska båda underteckna blanketten*)

Datum	Namnförtydligande 1
	Underskrift vårdnadshavare 1

Datum	Namnförtydligande 1
	Underskrift vårdnadshavare 2

Nationellt vaccinationsregister

Sedan 1 januari 2013 ska alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till ett vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten. Det innebär att Sverige får ett bättre verktyg för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram. Rapporteringen är obligatorisk och enligt lag måste vårdgivaren rapportera alla vaccinationer som ges inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn



Den här informationen från Folkhälsomyndighetens hemsida får ni gärna behålla

HPV

Den 1 januari 2010 infördes vaccination mot HPV i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

HPV är en förkortning för humant papillomvirus – det finns många olika HPV-virus som bland annat kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen, vilka på lång sikt kan leda till livmoderhalscancer.

Vaccin mot HPV skyddar mot mer än 70 % av all livmoderhalscancer. Om man vaccinerar sig i unga år, och som vuxen går på de cellprovskontroller man blir kallad till, kommer man att ha ett mycket bra skydd mot livmoderhalscancer. Före 14 års ålder ges vaccinet två gånger med 6 månaders mellanrum för att uppnå fullgod effekt. Efter 14 års ålder behövs tre doser.

Kan vaccinationen ge besvär?

Vaccinationen ges i överarmen och kan ge rodnad och i vissa fall svullnad och ömhet på injektionsstället, ibland även feber. Detta är inte farligt utan visar att kroppen reagerar på och bearbetar vaccinet, symtomen brukar gå över på någon dag.

När ska man skjuta upp vaccinationen?

Man undviker att vaccinera barn med akut infektionssjukdom och feber eller med tydligt nedsatt allmäntillstånd. Det är dock inget hinder att vaccinera om barnet har en lättare infektion som en vanlig förkylning.